

CULTIVO	LT/HA:	1A. DOSIS	2A. DOSIS	3A. DOSIS	4A. DOSIS
Col, Brocoli, Espinaca, Coliflor, Repollos	DOSIS	4	6		
	APLICACIÓN	20 días después del trasplante	20 días después de la primera aplicación		
Cebolla, Cebollín	DOSIS	6	8	10	10
	APLICACIÓN	15 a 20 días después del trasplante	30 días después de la primera aplicación	30 días después de la segunda aplicación	30 días después de la tercera aplicación
Caña	DOSIS	10	10	10	
	APLICACIÓN	20 a 30 cms. De altura del pelillo, asperjando al suelo	40 a 50 días después de la primera, asperjando al suelo	100 días después de la primera, asperjando al suelo	
Cebada	DOSIS	8	10		
	APLICACIÓN	15 a 20 días de nacida la planta	Al inicio de la floración		
Chilaca	DOSIS	4	6	8	8
	APLICACIÓN	15 a 20 días después del trasplante	Al inicio de la floración	Al amarre del tercer racimo	A medio corte
Chile Poblano	DOSIS	4	6	8	8
	APLICACIÓN	15 a 20 días después del trasplante	Al inicio de la floración	Al amarre del tercer racimo	A medio corte
Chile Serrano	DOSIS	4	6	8	8
	APLICACIÓN	15 a 20 días después del trasplante	Al inicio de la floración	Al amarre del tercer racimo	A medio corte
Durazno	DOSIS	6	8	8	6
	APLICACIÓN	Al inicio de la floración	A media flor	A medio fruto	En el último corte
Frijol	DOSIS	4	6	8	
	APLICACIÓN	15 a 20 días de nacida la planta	Al inicio de la floración	Vaina formada	
Haba	DOSIS	4	6	8	
	APLICACIÓN	15 a 20 días de nacida la planta	Al inicio de la floración	Cuando forma el fruto	
Jalapeño	DOSIS	4	6	8	8
	APLICACIÓN	15 a 20 días después del trasplante	Al inicio de la floración	Al amarre del tercer racimo	A medio corte
Jitomate	DOSIS	4	6	8	8
	APLICACIÓN	15 a 20 días después del trasplante	Al inicio de la floración	Al amarre del tercer racimo	A medio corte
Jitomate en Invernadero	DOSIS	6			
	APLICACIÓN	a partir de 15 días de trasplantada 6 litros semanales			
Lechuga	DOSIS	5	5		
	APLICACIÓN	20 días después del trasplante	15 días después de la primera aplicación		
Limón	DOSIS	6	8	8	6
	APLICACIÓN	Al inicio de la floración	Al inicio de la floración	A medio fruto	En el último corte
Maíz(90000 Plantas/ha) Orgánico Completo	DOSIS	10	10	10	
	APLICACIÓN	20-25 días después de nacida la planta 5 hojas verdaderas	15-20 días después de la primera	15-20 días después de la segunda antes de que empiece a espigar	

Tabla de Aplicación Litros por Hectárea

CULTIVO	LT/HA:	1A. DOSIS	2A. DOSIS	3A. DOSIS	4A. DOSIS
Maíz(60000/Plantas/ha) Organico Completo	DOSIS	6	8	8	
	APLICACIÓN	20-25 días después de nacida la planta 5 hojas verdaderas	15-20 días después de la primera	15-20 días después de la segunda antes de que empiece a espigar	
Maíz(90000 Plantas/ha) Complemento	DOSIS	6	6		
	APLICACIÓN	40 días después de nacida	15-20 días después de la segunda antes de que empiece a espigar		
Maíz(60000/Plantas/ha) Complemento	DOSIS	8	8		
	APLICACIÓN	40 días después de nacida	15-20 días después de la segunda antes de que empiece a espigar		
Mandarina	DOSIS	6	8	8	6
	APLICACIÓN	Al inicio de la floración	Al inicio de la floración	A medio fruto	En el último corte
Manzana	DOSIS	6	8	8	6
	APLICACIÓN	Al inicio de la floración	Al inicio de la floración	A medio fruto	En el último corte
Melón	DOSIS	4	6	8	8
	APLICACIÓN	15 a 20 días de nacida la planta	Al inicio de la floración	Al amarre del fruto	Después del primer corte
Naranja	DOSIS	6	8	8	6
	APLICACIÓN	Al inicio de la floración	A media Flor	A medio fruto	En el último corte
Papaya Maradol	DOSIS	3	6		
	APLICACIÓN	3 litros cada semana las primeras 4 semanas	6 litros cada semana las siguientes		
Piña	DOSIS	4	6	8	
	APLICACIÓN	20 a 30 días después del trasplante	40 días después de la primera	40 días después de la segunda	
Plátano	DOSIS	6	8	8	8
	APLICACIÓN	Al inicio de las lluvias	40 días después de la primera	40 días después de la segunda	40 días después de la tercera
Sandía	DOSIS	4	6	8	8
	APLICACIÓN	15 a 20 días de nacida la planta	Al inicio de la floración	Al amarre del fruto	Después del primer corte
Tejocote	DOSIS	6	8	8	6
	APLICACIÓN	Al inicio de la floración	A media Flor	A medio fruto	En el último corte para regenerar la planta para el siguiente ciclo
Toronja	DOSIS	6	8	8	6
	APLICACIÓN	Al inicio de la floración	A media Flor	A medio fruto	En el último corte para regenerar la planta para el siguiente ciclo
Vainilla	DOSIS	4	6	6	6
	APLICACIÓN	Al inicio de las lluvias y floración	A media Flor	Al amarre del fruto	A medio fruto

INDICACIONES:

Se diluyen los litros de cada dosis en 200 litros de agua y se aplica siempre en suelo húmedo, asperjando al suelo en zona de goteo. De preferencia aplicar muy temprano o por la tarde. **NUNCA APLICAR EN SUELO SECO.** Evitar la aplicación en horas de mayor calor. Revisar "tablas de sustitución" para optimizar sus recursos.